


Score WPI

Widespread pain index (WPI) score de 0 à 19: noter le nombre de zones où le patient a eu mal la semaine précédente

Dans combien de zones le patient a-t'il ressenti de la douleur ?

Le résultat devra se situer entre 0 et 19.



Echelle de sévérité des symptômes : SSS

Echelle de sévérité des symptômes : SSS (2A+2B score de 0 à 12)

a. Intensité des 3 symptômes = 2 A (de 0 à 9)

Pour chacun des 3 symptômes cités ci-dessus, indiquer le niveau de sévérité lors de la semaine précédente en utilisant l'échelle suivante :

	Fatigue	Somnolence	Symptômes cognitifs
0 = pas de problème			
1 = problèmes légers ou modérés, généralement modérés ou intermittents			
2 = problèmes modérés, considérables, souvent présents et /ou à niveau modéré			
3 = problèmes importants, persistants, continus, handicapants au quotidien			
Total score-2A			

b. Nombre des symptômes associés = 2 B (de 0 à 3)

Considérant les symptômes somatiques en général, indiquer si le patient a ressenti au cours de la semaine passée :

✓ Douleurs musculaires	✓ Syndrome de l'intestin irritable	✓ Fatigue
✓ Problème de mémoire ou de concentration	✓ Céphalées	✓ Douleurs/crampes abdominales
✓ Faiblesse musculaire	✓ Engourdissement/picotements	✓ Vertiges
✓ Insomnie	✓ Dépression	✓ Nervosité
✓ Constipation	✓ Douleurs abdominales hautes	✓ Nausées
✓ Douleur thoracique	✓ Diarrhée	✓ Bouche sèche
✓ Vision floue	✓ Fièvre	✓ Démangeaisons
✓ Sifflement respiratoire	✓ Syndrome de Raynaud	✓ Urticaire
✓ Acouphènes	✓ Vomissements	✓ Brûlure thoracique
✓ Aphtes buccaux	✓ Perte ou modification du goût	✓ Crise d'épilepsie
✓ Yeux secs	✓ Oppression respiratoire	✓ Perte d'appétit
✓ Eruption cutanée	✓ Hypersensibilité au soleil	✓ Trouble de l'audition
✓ Ecchymoses faciles	✓ Perte de cheveux	✓ Mictions fréquentes
✓ Douleurs à la miction	✓ Spasmes de la vessie	
Score-2B = Somme des symptômes :		

- 0 = score de 0
- 1 à 10 = score de 1
- 11 à 24 = score de 2
- 25 ou plus = score de 3

Le résultat de l'échelle **SSS = score 2A + score 2B.**

Le résultat final (2A+2B) doit se situer entre 0 et 12.

Interprétation : Un patient satisfait aux critères de diagnostic pour la fibromyalgie lorsque les **trois critères** suivants sont réunis :

- 1. Indice de douleur généralisée (WPI) ≥ 7 et SS ≥ 5 ou WPI 3-6 et SS ≥ 9 .**
- 2. Les symptômes sont présents à un niveau similaire depuis au moins 3 mois.**
- 3. Le patient ne présente aucun autre problème pouvant expliquer la douleur.**

Bibliographie: Wolfe F, et al. The American college of rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res 2010;62:600-10.

Source SFETD (sfetd-douleur.org)

-